

Stanovisko ČVS k používání pneumokokových vakcín u rizikových pacientů, tj. dle § 30 odst. 2 písm. b) bod 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění:

Očkování rizikových skupin pacientů proti pneumokokovým nákazám doporučujeme i nadále provádět plně hrazenou konjugovanou vakcínou Prevenar 13 ve věkové kategorii od 5- ti let, u dětí 2-5 let by měla zůstat ekonomicky nejméně náročnou variantou (ENNV) konjugovaná vakcína Synflorix.

Polysacharidová vakcína PNEUMOVAX 23 není rovnocennou očkovací látkou z hlediska principu navození imunitní odpovědi, vyžaduje opakované přeočkování a zvláště ve skupinách tzv. imunokompromitovaných rizikových skupin pacientů je pro základní očkování nevhodná. Její využití je prakticky možné jen pro případné rozšířené pokrytí v souladu s odbornými doporučeními pro vybrané skupiny rizikových pacientů.

V souladu s výše uvedeným stanoviskem by měla být stanovena ekonomicky nejméně náročná varianta samostatně pro vakcínu konjugovanou a zvláště pro vakcínu polysacharidovou. Jejich případné současné používání, intervaly mezi jednotlivými dávkami a přeočkování se bude řídit zveřejněnými stanovisky odborných společností (např. doporučení pro očkování hypospleniků a aspleniků, rizikových skupin, případně na základě rozhodnutí MZČR o antigenním složení i seniorů nad 65 let).